

ЙОДОСЕПТ
суппозитории вагинальные

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению препарата

ЙОДОСЕПТ

Регистрационный номер: ЛСР-002123/08 от 27.03.2008 г

Торговое название: Йодосепт

Международное непатентованное название: нет.

Лекарственная форма: суппозитории вагинальные

Описание: суппозитории коричневого цвета, торпедообразной формы, допускается мраморность поверхности.

Состав

Один суппозиторий содержит

Активное вещество: повидон-йод (йодовидон) – 200 мг.

Вспомогательные вещества: пропиленгликоль (1,2-пропиленгликоль), макрогол 1500 (полиэтиленоксид 1500).

Фармакотерапевтическая группа: антисептическое средство.

Код АТХ [G01AX11]

Фармакологические свойства

Антисептический препарат. Обладает широким спектром противомикробного действия. Активен в отношении бактерий, в т.ч. кишечной палочки, золотистого стафилококка, грибов, вирусов, простейших.

Активное вещество препарата - йод – находится в виде комплекса с поливинилпирролидоном. Концентрация активного йода – 0,1 – 1 %. При контакте с кожей и слизистыми йод постепенно и равномерно высвобождается, оказывая бактерицидное действие на микроорганизмы. На месте применения остается тонкий окрашенный слой, который сохраняется до тех пор, пока не высвободится все количество йода.

Показания к применению

Лечение острых и хронических инфекционно-воспалительных заболеваний влагалища (трихомонадные, грибковые, вирусные, неспецифические и смешанные инфекции); бактериального вагинита. Профилактика инфекционно-воспалительных осложнений перед проведением гинекологических вмешательств (искусственное прерывание беременности, установка и удаление внутриматочной спирали, диатермокоагуляция шейки матки, гистеросальпингография и другие).

Противопоказания

Гиперчувствительность к компонентам препарата, тиреотоксикоз, герпетиформный дерматит Дюринга, аденома щитовидной железы, почечная недостаточность, одновременная терапия радиоактивным йодом, дети до 18 лет, I триместр беременности.

С осторожностью

Хроническая почечная недостаточность, II и III триместры беременности, период лактации.

Способ применения и дозы

Препарат применяют интравагинально. Предварительно освободив суппозиторий от контурной ячейковой упаковки, его вводят глубоко во влагалище, лежа на спине. При острых вагинитах – по 1 суппозиторию 2 раза в сутки в течение 7 дней, при подострых и хронических вагинитах – по 1 суппозиторию 1 раз в сутки (вечером перед сном) в течение 14 дней. Для предоперационной профилактики осложнений инфекционного генеза в гинекологии – 2 раза в сутки (утром и вечером перед сном) в течение 1 – 7 дней (независимо от фазы менструального цикла).

Побочное действие

Аллергические реакции (зуд, гиперемия слизистой влагалища).

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Не следует применять препарат в комплексе с другими антисептическими средствами, содержащими ртуть, окислители, щелочи и катионные поверхностно-активные вещества.

В присутствии крови бактерицидное действие препарата может уменьшиться.

Особые указания

В случае неманифестного гипертиреоза и других заболеваний щитовидной железы (особенно у пожилых больных) препарат применяется только по строгим показаниям и под постоянным врачебным контролем.

Избегать попадания в глаза.

Форма выпуска

Суппозитории вагинальные 200 мг.

По 5 суппозитория в контурной ячейковой упаковке. 2 контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по применению помещены в картонную пачку.

Условия хранения

В сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте, при температуре не выше 15 °С.

Срок годности

5 лет. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Производитель

ПАО «Биосинтез», Россия, 440033, г. Пенза, ул. Дружбы, 4.

Претензии потребителей направлять в адрес производителя:

ПАО «Биосинтез», Россия, 440033 г. Пенза, ул. Дружбы, 4, тел/факс (8412) 57-72-49.